
Produktname: p73 (Acetyl Lys327) Kaninchen-polyklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: APRab06248**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ELISA
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Acetyliert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung**Verdünnungsverhältnis** WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000**tnis****Molekulargewicht** 70kDa**Antigen-Informationen****Genname** TP73**Alternative Namen** TP73; P73; Tumor protein p73; p53-like transcription factor; p53-related protein**Gen-ID** 7161.0**SwissProt ID** O15350**Immunogen** Das Antiserum wurde gegen ein synthetisches Acetylpeptid hergestellt, das vom humanen p73-Protein im Bereich der Acetylierungsstelle von Lys327 abgeleitet ist. Aminosäurebereich: 291–340


Hintergrund

Tumorsuppressorprotein p73 (TP73) Homo sapiens. Dieses Gen kodiert ein Mitglied der p53-Familie von Transkriptionsfaktoren, die an zellulären Stressreaktionen und der Entwicklung beteiligt sind. Es liegt auf einer Region auf Chromosom 1p36, die häufig bei Neuroblastomen und anderen Tumoren deletiert ist und vermutlich mehrere Tumorsuppressorgene enthält. Der Nachweis, dass dieses Gen monoallelisch exprimiert wird (wahrscheinlich vom mütterlichen Allel), stützt die Annahme, dass es ein Kandidatengen für Neuroblastome ist. Für dieses Gen wurden zahlreiche Transkriptvarianten gefunden, die durch alternatives Spleißen und/oder die Verwendung alternativer Promotoren entstehen. Die biologische Validität und die vollständige Sequenz einiger Varianten sind jedoch noch nicht geklärt. [bereitgestellt von RefSeq, Feb. 2011], Kofaktor: Bindet 1 Zinkion pro Untereinheit., Erkrankung: Liegt in einer Chromosomenregion, die in verschiedenen Zelllinien menschlicher Krebserkrankungen häufig mutiert ist. Im Gegensatz zu p53 scheint TP73 in menschlichen Krebserkrankungen nicht häufig mutiert zu sein. Hemizygotie wird bei Neuroblastomen und Oligodendrogliomen beobachtet. Domäne: Besitzt eine saure Transaktivierungsdomäne, eine zentrale DNA-Bindungsdomäne und eine C-terminale Oligomerisierungsdomäne, die an die SH3-Domäne der ABL-Tyrosinkinase bindet. Domäne: Das WW-Bindungsmotiv vermittelt die Interaktion mit WWOX. Funktion: Beteiligt sich an der apoptotischen Reaktion auf DNA-Schäden. Isoformen mit der Transaktivierungsdomäne sind proapoptotisch, Isoformen ohne diese Domäne sind antiapoptotisch und blockieren die Funktion von p53 und transaktivierenden p73-Isoformen. Könnte ein Tumorsuppressorprotein sein. Induktion: Wird nicht durch DNA-Schäden induziert. Isoformen ohne Transaktivierungsdomäne blockieren die Geninduktion. Sonstiges: Aktiviert und stabilisiert durch Interaktion mit RANBP9. PTM: Isoform alpha (aber nicht Isoform beta) ist an Lys-627 sumoyliert, was den proteasomalen Abbau verstärkt, aber die Transkriptionsaktivität nicht beeinflusst. Ähnlichkeit: Gehört zur p53-Familie. Ähnlichkeit: Enthält eine SAM-Domäne (steriles Alpha-Motiv). Subzelluläre Lokalisation: Akkumuliert im Zellkern als Reaktion auf DNA-Schäden. Untereinheit: Liegt in einem Komplex mit p53/TP53 und CABLES1 vor. Die C-terminale Oligomerisierungsdomäne bindet an die SH3-Domäne der ABL-Tyrosinkinase. Interagiert mit HECW2. Isoform beta interagiert homotypisch und mit p53/TP53, Isoform alpha hingegen nicht. Isoform Gamma interagiert homotypisch und mit allen p73-Isoformen. Isoform Delta interagiert homotypisch mit Isoform Gamma, Isoform Alpha. Die Isoformen Alpha und Beta interagieren mit HIPK2. Isoform Alpha interagiert mit RANBP9. Isoform Beta interagiert mit WWOX. Gewebespezifität: Gehirn, Niere, Plazenta, Dickdarm, Herz, Leber, Milz, Skelettmuskulatur, Prostata, Thymus und Pankreas. Stark exprimiert in fötalem Gewebe.


Forschungsbereich

p53;Neurotrophin;


Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Lysat aus Jurkat-Zellen unter Verwendung des p73 (Acetyl-Lys327)-Antikörpers.



Western-Blot-Analyse von Jurkat-Zellen mit einem polyklonalen Acetyl-p73 (K327)-Antikörper. Der Sekundäantikörper wurde 1:20000 verdünnt.



Western-Blot-Analyse von JK-Zellen mit einem polyklonalen Acetyl-p73 (K327)-Antikörper. Der Sekundäantikörper wurde 1:20000 verdünnt.