

**Produktname:** Transmembranprotein 9B Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.:** AMRe02700

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,68 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 23 kDa; Observed MW: 23 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	TMEM9B
<b>Alternative Namen</b>	C11orf15
<b>Gen-ID</b>	56674
<b>SwissProt ID</b>	Q9NQ34
<b>Immunogen</b>	Rekombinantes Protein des humanen TMEM9B

**Hintergrund**


Verstärkt die Produktion von durch TNF, IL-1 $\beta$  und TLR-Liganden induzierten proinflammatorischen Zytokinen. Spielt eine Rolle

bei der TNF-Aktivierung sowohl des NF- $\kappa$ B- als auch des MAPK-Signalwegs.


## Forschungsbereich

Epigenetik und nukleäre Signalgebung

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von TMEM9B in Hacat- und PC-12-Lysaten unter Verwendung eines Antikörpers gegen das Transmembranprotein 9B.



Western-Blot-Analyse von TMEM9B in 3T3-Lysaten unter Verwendung eines TMEM9B-Antikörpers.