

製品名: リン酸化 4E BP1 (Thr37) ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab00918**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	リン酸化
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% アジ化ナトリウムを含む PBS 液 (pH 7.3)。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
分子量	Calculated MW: 13 kDa; Observed MW: 18 kDa

抗原情報

遺伝子名	EIF4EBP1
別名	EIF4EBP1; Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; 4E-BP1; eIF4E-binding protein 1; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1; PHAS-I
遺伝子 ID	1978
SwissProt ID	Q13541
免疫原	標的タンパク質の残基に対応する合成リン酸化ペプチド

背景


翻訳抑制タンパク質 4E-BP1 (別名 PHAS-1) は、翻訳開始因子 eIF4E に結合してキャップ依存性翻訳を阻害します。4E-BP1 の過剰

リン酸化はこの相互作用を阻害し、キャップ依存性翻訳を活性化します。PI3 キナーゼ/Akt 経路と FRAP/mTOR キナーゼの両方が 4E-BP1 の活性を制御します。


研究分野

エピジェネティクスと核シグナル伝達

画像データ



Phospho-4E BP1 (Thr37) 抗体を使用した MDAMB435 溶解物中の Phospho-4E BP1 (Thr37) のウエスタンブロット分析。



4EBP1 (リン酸化 Thr36) 抗体を用いたパラフィン包埋ヒト乳癌の免疫組織化学染色。抗原賦活化には、高圧高温クエン酸ナトリウム (pH 6.0) を使用しました。右側はブロッキングペプチドを添加したサンプルです。