

**製品名: HDAC5 (リン酸化 Ser498) ウサギポリクローナル抗体****カタログ番号: APRab04764**

研究使用のみ

**概要**

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	リン酸化
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください (12 ヶ月有効)。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:10000-1:20000
分子量	122kDa

**抗原情報**

遺伝子名	HDAC5
別名	HDAC5; KIAA0600; Histone deacetylase 5; HD5; Antigen NY-CO-9
遺伝子 ID	10014.0
SwissProt ID	Q9UQL6
免疫原	抗血清は、ヒト HDAC5 の Ser498 リン酸化部位付近の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 464-513

**背景**


ヒストンは転写制御、細胞周期の進行、そして発生過程において重要な役割を果たします。ヒストンのアセチル化/脱アセチル化は染

色体構造を変化させ、転写因子の DNA へのアクセスに影響を与えます。この遺伝子によってコードされるタンパク質は、クラス II ヒストン脱アセチル化酵素/acuc/alpha ファミリーに属します。ヒストン脱アセチル化酵素活性を有し、プロモーターに連結された状態で転写を抑制します。HDAC3 ファミリーのメンバーとのみ共免疫沈降し、多重複合体タンパク質を形成する可能性があります。また、筋細胞エンハンサー因子 2 (MEF2) タンパク質とも相互作用し、MEF2 依存性遺伝子の発現抑制を引き起こします。この遺伝子は大腸がんとの関連が示唆されています。この遺伝子には、異なるアイソフォームをコードする 2 つの転写バリエーションが見つかっています。 [RefSeq 提供、2008 年 7 月],触媒活性: ヒストンの N(6)-アセチルリジン残基を加水分解し、脱アセチル化ヒストンを生成する。 ,ドメイン: 核外輸送配列は、核と細胞質間の輸送を媒介する。 ,機能: コアヒストン (H2A、H2B、H3、H4) の N 末端リジン残基の脱アセチル化を担う。ヒストンの脱アセチル化は、エピジェネティック抑制の標識となり、転写調節、細胞周期の進行、発達過程において重要な役割を果たしている。ヒストン脱アセチル化酵素は、巨大な多タンパク質複合体の形成を介して作用する。筋細胞エンハンサー MEF2C の転写を抑制することで、筋成熟に関与する。筋分化の過程で細胞質に移行し、心筋細胞エンハンサー因子の発現を可能にする。 ,PTM:CaMK によって Ser-259 と Ser-498 がリン酸化される。このリン酸化は細胞質への輸送に必要である。 ,PTM:ユビキチン化される。しかし、ポリユビキチン化は分解を招かない。 ,類似性:ヒストン脱アセチル化酵素ファミリーに属します。タイプ 2 サブファミリー。 ,細胞内局在:核と細胞質の間を輸送されます。筋細胞では、心筋分化の過程で細胞質に移行します。細胞質への輸送は、14-3-3 シャペロンタンパク質との相互作用に依存し、CaMK による Ser-259 と Ser-498 のリン酸化によるものです。 , サブユニット :AHRR と相互作用します (類似性による) 。 BCOR、HDAC7、HDAC9、CTBP1、MEF2C、NCOR2、NRIP1、PHB2、および 14-3-3 シャペロンタンパク質と相互作用する。KDM5B とも相互作用する。 ,組織特異性: 普遍的。 ,


## 研究分野

タンパク質アセチル化


## 画像データ




HDAC5 (リン酸化 Ser498) 抗体を用いたパラフィン包埋ヒト乳癌の免疫組織化学染色。右の写真はリン酸化ペプチドでブロッキングした状態。



HDAC5 (リン酸化 Ser498) 抗体を用いた Jurkat 細胞ライセートのウェスタンブロット解析。右レーンはリン酸化ペプチドでブロッキングされている。



リン酸化 HDAC5 (S498) ポリクローナル抗体 (1: 500 希釈) を用いた各種細胞のウェスタンブロット解析



リン酸化 HDAC5 (S498) ポリクローナル抗体 (1: 500 希釈) を用いた VEC 細胞のウェスタンブロット解析