

**製品名: IRAK-1 ウサギポリクローナル抗体****カタログ番号: APRab12725**

研究使用のみ

**概要**

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:50-1:300
分子量	76kDa

**抗原情報**

遺伝子名	IRAK1
別名	IRAK1; IRAK; Interleukin-1 receptor-associated kinase 1; IRAK-1
遺伝子 ID	3654.0
SwissProt ID	P51617
免疫原	抗血清はヒト IRAK1 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 353-402

**背景**


この遺伝子は、刺激によりインターロイキン-1 受容体 (IL1R) と会合する 2つの推定セリン/スレオニンキナーゼのうちの 1つである、インターロイキン-1 受容体関連キナーゼ 1 をコードします。この遺伝子は、IL-1 誘導性転写因子 NF-κB の上方制御に部分的に関

与しています。この遺伝子には、異なるアイソフォームをコードする選択的スプライシング転写バリエーションが見つっています。  
[RefSeq 提供、2008 年 7 月]、触媒活性: ATP + タンパク質 = ADP + リン酸化タンパク質。補因子: マグネシウム。機能: IL-1 の結合後に IL-1 I 型受容体に結合し、細胞内シグナル伝達カスケードを誘導して転写の上方制御と mRNA の安定化をもたらします。アイソフォーム 1 は急速に結合しますが、その後分解され、アイソフォーム 2 がサイトカインに対するより緩やかな、より持続的な応答を媒介します。アイソフォーム 2 は不活性であるため、この酵素のキナーゼ活性は IL-1 シグナル伝達に必要なではないことが示唆されています。IRAK1 はリン酸化されると、アダプタータンパク質 PELI1 をリクルートします。PTM: IL-1RI へのリクルート後、IRAK4 によって自己リン酸化またはトランスリン酸化されます。アイソフォーム 1 の場合、これはユビキチン化および分解に関連しています。類似性: タンパク質キナーゼスーパーファミリーに属します。類似性: タンパク質キナーゼスーパーファミリーに属します。TKL Ser/Thr タンパク質キナーゼファミリー。Pelle サブファミリー。類似性: 1 つのタンパク質キナーゼドメインを含みます。サブユニット: IL-1 刺激は、PELI1 の結合後に IL-1 受容体から解離するシグナル伝達複合体の形成につながります。IL1RL1 と相互作用します。IRAK1BP1 と相互作用する。組織特異性: アイソフォーム 1 とアイソフォーム 2 は、調べたすべての組織で普遍的に発現しており、アイソフォーム 1 はアイソフォーム 2 よりも強く発現している。


## 研究分野

アポトーシス阻害;ミトコンドリアアポトーシス;アポトーシスの概要;Toll 様神経栄養因子;

## 画像データ



IRAK1 抗体を用いた HeLa 細胞ライセートのウェスタンブロット解析。右レーンには合成ペプチドでブロッキングされている。



IRAK-1 ポリクローナル抗体を用いた様々な細胞のウェスタンブロット解析