

**製品名: 嗅覚受容体 2C3 ウサギポリクローナル抗体****カタログ番号: APRab15186**

研究使用のみ

**概要**

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ICC/IF,ELISA
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	36kDa

**抗原情報**

遺伝子名	OR2C3
別名	OR2C3; OR2C4; OR2C5P; Olfactory receptor 2C3; Olfactory receptor 2C4; Olfactory receptor 2C5; Olfactory receptor OR1-30
遺伝子 ID	81472.0
SwissProt ID	Q8N628
免疫原	抗血清はヒト OR2C3 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 231-280

**背景**


嗅覚受容体ファミリー 2 サブファミリー C メンバー 3 (OR2C3) ホモサピエンス嗅覚受容体は鼻腔内の嗅覚分子と相互作用し、嗅覚

の知覚を引き起こす神経反応を惹起します。嗅覚受容体タンパク質は、単一のコーディングエクソン遺伝子から生じる G タンパク質共役受容体 (GPCR) の大規模なファミリーのメンバーです。嗅覚受容体は、多くの神経伝達物質受容体やホルモン受容体と 7 つの膜貫通ドメイン構造を共有し、嗅覚シグナルの認識と G タンパク質を介した伝達を担っています。嗅覚受容体遺伝子ファミリーはゲノム中で最大のファミリーです。この生物の嗅覚受容体遺伝子およびタンパク質に割り当てられた命名法は、他の生物とは独立しています。 [RefSeq 提供、2008 年 7 月];注意:Met-1 と Met-2 のどちらがイニシエーターであるかは不明です。機能:嗅覚受容体。類似性:G タンパク質共役受容体 1 ファミリーに属します。、

## 研究分野

嗅覚伝達;

## 画像データ



OR2C3 抗体を用いた COLO 細胞ライセートのウェスタンブロット解析。右レーン合成ペプチドでブロッキングされている。