

製品名: T2R48 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab18573**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率 WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000

分子量

抗原情報

遺伝子名	TAS2R19
別名	TAS2R19; TAS2R23; TAS2R48; Taste receptor type 2 member 19; Taste receptor type 2 member 23; Taste receptor type 2 member 48; T2R48
遺伝子 ID	259294.0
SwissProt ID	P59542
免疫原	抗血清はヒト TAS2R48 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 90-139

背景


機能: 苦味の知覚に関与する可能性のある受容体で、ガストデューシンと関連しています。消化管内容物の化学組成を感知する役割

を果たす可能性があります。この受容体の活性は、 α ガストデュースンを刺激し、PLC- β -2 の活性化を媒介し、TRPM5 のゲーティングにつながる可能性があります。、その他：ほとんどの味覚細胞は、限られた数の苦味化合物によって活性化される可能性があります。個々の味覚細胞は、苦味刺激を区別することができます。、類似性：G タンパク質共役受容体 T2R ファミリーに属します。、組織特異性：舌の味覚受容体細胞のサブセットで発現し、ガストデュースン陽性細胞にのみ発現します。、機能：苦味の知覚に与する可能性のある受容体で、ガストデュースンと関連しています。消化管内容物の化学組成を感知する役割を果たす可能性があります。この受容体の活性は、 α ガストデュースンを刺激し、PLC- β -2 の活性化を媒介し、TRPM5 のゲーティングにつながる可能性がある。、その他：ほとんどの味覚細胞は、限られた数の苦味化合物によって活性化される可能性がある。個々の味覚細胞は、苦味刺激を区別することができる。、類似性：G タンパク質共役受容体 T2R ファミリーに属する。、組織特異性：舌の味覚受容体細胞のサブセットで発現し、ガストデュースン陽性細胞にのみ発現する。、

研究分野

味覚伝達

画像データ



TAS2R48 抗体のウェスタンブロット解析。右レーンは TAS2R48 ペプチドでブロッキングされている。