

**製品名: VEGFR2 ウサギポリクローナル抗体****カタログ番号: APRab19777**

研究使用のみ

**概要**

|        |  |
|--------|--|
| 説明     | ウサギポリクローナル抗体                                       |
| 宿主     | うさぎ  |
| 応用     | WB,IHC,ICC/IF,ELISA                                |
| 反応性    | 人間   |
| 標識     | 非共役  |
| 修飾     | 未修正  |
| アイソタイプ | IgG  |
| クローン性  | ポリクローナル  |
| 形態     | 液体   |
| 濃度     | 1mg/ml   |
| 保存     | アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。  |
| 輸送     | 氷袋   |
| バッファー  | 50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。 |
| 精製     | アフィニティー精製  |

**応用**

|      |   |
|------|---|
| 希釈倍率 | WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:10000-1:20000 |
| 分子量  |   |

**抗原情報**

|              |  |
|--------------|--|
| 遺伝子名         | KDR FLK1 VEGFR2  |
| 別名           | Vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR-2;EC 2.7.10.1;Fetal liver kinase 1;FLK-1;Kinase insert domain receptor;KDR;Protein-tyrosine kinase receptor flk-1;CD antigen CD309) |
| 遺伝子 ID       | 3791.0   |
| SwissProt ID | P35968   |
| 免疫原          | アミノ酸配列範囲 1268-1341 のヒトタンパク質からの合成ペプチド   |


**背景**

血管内皮増殖因子 (VEGF) は、内皮細胞の主要な増殖因子です。この遺伝子は、VEGF の2つの受容体のうちの1つをコードしています。キナーゼ挿入ドメイン受容体として知られるこの受容体は、III 型受容体チロシンキナーゼです。VEGF 誘導性血管内皮細胞の増殖、生存、遊走、尿細管形態形成、および出芽の主要なメディエーターとして機能します。この受容体のシグナル伝達と輸送は、Rab GTPase、P2Y プリンヌクレオチド受容体、インテグリン  $\alpha V\beta 3$ 、T 細胞タンパク質チロシンホスファターゼなど、複数の因子によって制御されています。この遺伝子の変異は、乳児毛細血管腫に関与していることが示唆されています。 [RefSeq 提供、2009年5月], 触媒活性:  $ATP + a [タンパク質]-L-チロシン = ADP + a [タンパク質]-L-チロシンリン酸$ 。機能: VEGF または VEGFC の受容体。チロシンタンパク質キナーゼ活性を有する。VEGF キナーゼリガンド/受容体シグナル伝達系は、血管の発達と血管透過性の調節に重要な役割を果たしている。HIV-1 感染の場合、細胞外ウイルス Tat タンパク質との相互作用がカポジ肉腫病変における血管新生を促進するようである。類似性: タンパク質キナーゼスーパーファミリーに属します。Tyr タンパク質キナーゼファミリー。類似性: タンパク質キナーゼスーパーファミリーに属します。Tyr タンパク質キナーゼファミリー。CSF-1/PDGF 受容体サブファミリー。類似性: 1 つのタンパク質キナーゼドメインを含む。類似性: 7 つの Ig 様 C2 型 (免疫グロブリン様) ドメインを含む。サブユニット: MYOF と相互作用する (類似性による)。VEGF 活性化時に SHB と相互作用する。HIV-1 Tat と相互作用する。、


## 研究分野

サイトカイン-サイトカイン受容体相互作用;エンドサイトーシス;VEGF;焦点接着;

## 画像データ



パラフィン包埋ヒト乳癌の免疫組織化学分析、抗体は 1:200 に希釈された



パラフィン包埋ヒト胎盤の免疫組織化学分析、抗体は 1:200 に希釈された