

製品名: シクロオキシゲナーゼ 2 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号:** AMRe85450

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:10-1:20
分子量	Calculated MW: 69 kDa; Observed MW: 74 kDa

抗原情報

遺伝子名	Cyclooxygenase 2
別名	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
遺伝子 ID	5743.0
SwissProt ID	P35354
免疫原	ヒト COX2/シクロオキシゲナーゼ 2 の組換えタンパク質

背景


アラキドン酸をプロスタグランジン H2 (PGH2) に変換することは、プロスタノイド合成における重要なステップです。PTGS2 は、

内皮細胞、腎臓、脳などの生理学的状態、および癌などの病理学的状態において、一部の組織で恒常的に発現しています。PTGS2は炎症性プロスタグランジンの産生を担っています。PTGS2の発現上昇は、細胞接着の増強、表現型の変化、アポトーシス抵抗性、腫瘍血管新生にも関連しています。癌細胞において、PTGS2はプロスタグランジン E2 (PGE2) 産生の重要なステップであり、PGE2は運動性、増殖、アポトーシス抵抗性の調節において重要な役割を果たします。


研究分野

-

画像データ



シクロオキシゲナーゼ 2 抗体を使用した A549 溶解物中の COX2/シクロオキシゲナーゼ 2 のウェスタン ブロット分析。



COX2/シクロオキシゲナーゼ 2 抗体を使用した 3T3 溶解物中の COX2/シクロオキシゲナーゼ 2 のウェスタン ブロット分析。