제품명: 플로틸린**-1(6C10)** 마우스 단클론 항체
카탈로그 번호: AMM11030
연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	인간, 쥐, 생쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	PBS(pH 7.4)는 보존 제 0.5%, 신규 방부제 N 0.02% 및 글리세롤 50%를 함유합니다.
정제	친화성 정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	49kDa

항원 정보

유전자명	FN1
다른 이름	FN1; FN; Fibronectin; FN; Cold-insoluble globulin; CIG
유전자 ID	2335.0
SwissProt ID	P02751
면역원	플로틸린1 의 인간 펩타이드

배경

이 유전자는 혈장에 존재하는 용해성 당단백질 형태와 세포 표면과 세포외 기질에 존재하는 불용성 당단백질 형태로 발현됩니다. 발현은 단일 유전자 전사체의 대체 스플라이싱을 통해 발생하는 것으로 보이며, 이 유전자는 세 개의 다른 단백질 생성물을 가지고 있으며 길이는 220 개 이상의 다른 단백질 생성물이 있습니다. 이 중 적어도 하나는 단백질 분해 과정을 거치는 것으로 입증되었습니다. 일부 변이체 전사체는 아직 완전히 설명되지 않았습니다. [RefSeq 제공, 2016 년 1 월, 대체 폴리 추적 아형 정보는 것으로 입증 됨] 단계 Ugl-Y1, Ugl-Y2 및 Ugl-Y3 는 0 세부

터 17 세까지의 소변에서 검출됨. 질병: FN1 의 결함은 피브로넥틴 침착을 동반한 사구체병증 2 형(GFND2) [MIM:601894]의 원인이며, 가족성 피브로넥틴 침착 사구체신염 또는 피브로넥틴 사구체병증으로도 알려져 있음. GFND 는 유전적으로 이질적인 상염색체 우성 질환으로, 임상적으로 단백뇨, 현미경적 혈뇨 및 고혈압을 특징으로 하며, 20 대에서 50 대에 말기 신부전으로 진행됨. 기능: 피브로넥틴은 세포 표면 및 콜라겐, 피브린, 헤파린, DNA, 액틴을 포함한 다양한 화합물에 결합함. 피브로넥틴은 세포 접착, 세포 운동성, 옵소닌화, 상처 치유 및 세포 형태 유지에 관여합니다. TNR 과의 상호작용은 세포 접착 및 신경돌기 성장의 억제를 매개합니다. 온전한 정보: 피브로넥틴 항목, PTM: F13A 또는 TGM2 와 같은 트랜스글루타미나제에 의해 매개되는 공유 가교결합을 형성하여 글루타민과 리신 잔기의 엡실론 아미노기 사이에 형성되어 동종중합체 및 이종중합체(예: 피브리노겐-피브로넥틴, 콜라겐-피브로넥틴 이종중합체)를 형성합니다. PTM: Thr-2064 와 Thr-2065 중 둘 다 또는 하나만 당화되는지는 알려져 있지 않습니다. PTM: 황화됨. 유사성: 12 개의 피브로넥틴 유형 I 도메인을 포함합니다. 유사성: 16 개의 피브로넥틴 유형 III 도메인을 포함합니다. 유사성: 2 개의 피브로넥틴 유형 II 도메인을 포함합니다. 소단위: 주로 대안적으로 이종이량체 또는 다량체입니다. 카르복실 말단 부근에 2 개의 이황화 결합으로 연결된 스플라이스 변이체, 더 작은 정도로 동종이량체. FBLN1, AMBP, TNR, LGALS3BP 및 COL13A1 과 상호작용합니다. FBLN7 과도 상호작용합니다. 조직 특이성: 혈장 FN(가용성 이량체 형태)은 간세포에서 분비됩니다. 섬유아세포, 상피세포 및 기타 세포 유형에서 생성되는 세포성 FN(이량체 또는 가교결합된 다량체 형태)은 세포외기질에 불용성 형태로 침착됩니다. Ugl-Y1, Ugl-Y2 및 Ugl-Y3 는 소변에서 발견됩니다.

연구 분야

세포 접착, 세포외기질 수용체 상호작용, 액틴 및 세포골격 조절, 암 관련 경로, 소세포폐암

이미지 데이터



1) 마우스 뇌 조직, 2) 쥐 뇌 조직에 대한 웨스턴 블롯 분석(1:2000 희석).