



식물 자체 결합 DNA 의 길이가 짧다 이 소위 낮은 친화 DNA 결합에 관하여 단일 OB 도구를 포함하여 각기 많이 많은 경우 단일 상호작용는 날형 선도를 포함하고 있습니다 RPA 복합체 변형 형태에 대한 상반응을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다

연구 분야


이미지 데이터




HeLa(1), MCF-7(2), T47D(3), Ramos(4), HEK293(5), HepG2(6) 및 A431(7) 세포 용출물에 대한 RFA2 마우스 mAb 를 사용하여 Western blot 분석




RFA2 마우스 mAb (녹색)와 음성 대조군 (빨색)을 사용하여 HeLa 세포를 유세포 분석기로 분석한 결과




RFA2 마우스 mAb (DAB 염색)을 사용하여 HeLa 세포를 면역조직화학 분석



DAB 염색을 위한 RFA2 마우스 mAb 를 사용하여 HeLa 세포를 면역조직화학 분석



RFA2 마우스 뇌 조직에 DAB 염색을 통한 과민성 뇌인상 자극 후 조직면역조직화학분석



RFA2 마우스 뇌 조직에 DAB 염색을 통한 과민성 뇌인상 자극 후 조직면역조직화학분석