

제품명: AP-1(인산화 Tyr170) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab04240

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인산화 생체
결합	비결합
변형	인산화
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보르네올 0.5%, 산기방부제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	39-42kDa

항원 정보

유전자명	JUN
다른 이름	JUN; Transcription factor AP-1; Activator protein 1; AP1; Proto-oncogene c-Jun; V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog; p39
유전자 ID	3725.0
SwissProt ID	P05412
면역원	이 항체는 Tyr170 인산화유추인 c-Jun 유래 항원을 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위: 137-186

배경

이 유전자는 류코주 바이러스 17 의 종양 발암 유전자입니다. 이 유전자는 비인산 단백질에 유한 단백질 암호화해 특정 DNA 서열 직접 결합하여 유전자 발현을 조절합니다. 유전자 발현이 없거나 약한 경우 에 전이 및 결합 단백질은 체염인 p32-p31 에 위치합니다. [RefSeq 제공 2008 년 7 월, 가능 염색체 위치 5'-TGA[CG]TCA-3'를 인산화 결합는 전이자 PTM: 인산화 전 발현을

