제품명: ARK-2/3 (인산화 **Thr236/202)** 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab04261
연구용 전용

요약

설명	토끼다클론항체
숙주	토끼
적용	IHC,ICC/IF,ELISA
반응성	인간,쥐,생쥐
결합	비결합
변형	인산화된
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤50%, 보호단백질0.5%, 신규방부제N 0.02%를함유한PBS 용액
정제	친화성정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:20000
분자량	-

항원 정보

유전자명	AURKB/AURKC
다른 이름	AURKB; AIK2; AIM1; AIRK2; ARK2; STK1; STK12; STK5; Aurora kinase B; Aurora 1; Aurora- and IPL1-like midbody-associated protein 1; AIM-1; Aurora/IPL1-related kinase 2; ARK-2; Aurora-related kinase 2; STK-1; Serine/threonine-protein kinase 12
유전자 ID	9212/6795
SwissProt ID	Q96GD4/Q9UQB9
면역원	이항혈청은Thr236/202 인산화부위주변의인간AurB/C 유래합성펩타이드를대상으로생성되었습니다. 해당산물위 201-250

배경

이유전자는세린/트레오닌키나제패밀리에속하는오로라키나제의구성원을암호화합니다.이단백질은두구성원을암호화하는유전자는 19 번과 20 번염색체에위치합니다.이키나제는세포분열을통제하는분열기간동안염색

의 정렬 및 분리 조절에 관여합니다. 이 유전자의 유사 유전자(pseudogene)는 8 번 염색체에 존재합니다. 이 유전자에서는 여러 가지 대체 스플라이싱 전사 변이체가 발견되었습니다. [RefSeq 제공, 2015 년 9 월], 촉매 활성 ATP + 단백질 = ADP + 인산화 단백질, 보조 인자: 마그네슘, 질병: 발현 조절의 파괴는 세포 분열에 대한 우성 음성 효과를 통해 암세포에서 염색체 안정성 결핍의 가능한 기전이다; 기능: 극성 방추 미세관의 적절한 조절에 직접적으로 관여할 수 있으며, 유사 분열 중 세포 분열 시작의 핵심 조절자이다. 유사 분열의 핵심 조절자 역할을 하는 염색체 동반 복합체(CPC)의 구성 요소이다. CPC 복합체는 중심체에서 정확한 염색체 정렬 및 분리를 보장하는 데 필수적인 기능을 하며, 염색질 유도 미세소관 안정화 및 방추체 형성에 필요하다. 유사성: 단백질 키나아제 슈퍼패밀리에 속하며, 세린/트레오닌 단백질 키나아제 패밀리, 오로라 서브패밀리에 속합니다. 유사성: 1 개의 단백질 키나아제 도메인을 포함합니다. 세포 내 위치: 전기부터 중기까지 염색체 팔과 중심체 인접 부위에 위치하고, 후기부터 세포질 분열까지 방추체 중앙부와 세포체 중앙부로 이동합니다. 세포체 중앙부에서 감마 튜불린과 함께 존재합니다. 소단위: TACC1 과 상호작용합니다. M 기 동안 RACGAP1 과 결합합니다. BIRC5/서바이빈, CDCA8/보레알린, INCENP 및 AURKB/오로라-B 로 구성된 CPC 의 구성 요소입니다. CDCA1 및 NDC80 과 상호작용합니다. EVI5 와 상호작용합니다. 조직 특이성: 고환에서 높은 수준으로 발현됩니다. 또한 방광, 폐, 고환, 결장, 태반 및 태아 간에서도 발현됩니다. S 기 및 G2/M 기에 발현되며, 암세포에서는 M 기에 발현이 증가합니다.

연구 분야

-

이미지 데이터



AurB/C(Phospho-Thr236/202) 항체를 사용한 면역원 인산화 펩타이드(Phospho-left) 및 비인산화 펩타이드(Phospho-right)에 대한 효소결합면역흡착분석법(Phospho-ELISA)



파라핀에 포매된 인간 뇌 조직에 대한 면역조직화학 분석(AurB/C 항체 사용, 인산화 Thr236/202). 오른쪽 그림은 인산화 펩타이드로 처리한 결과이다
.