제품명: MEF-2(인산화 **Thr312)** 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab04994
연구용 전용

요약

설명	토끼다클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP
반응성	인간,쥐,생쥐
결합	비결합
변형	인산화된
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤50%, 보존제0.5%, 신규방부제N 0.02%를함유한PBS 용액
정제	친화성정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:10000-1:20000,IP 1:20-1:50
분자량	-

항원 정보

유전자명	MEF2A
다른 이름	MEF2A; MEF2; Myocyte-specific enhancer factor 2A; Serum response factor-like protein 1
유전자 ID	4205.0
SwissProt ID	Q02078
면역원	이항체는Thr312 인산화부위근처의인간MEF2A 유래합성펩타이드를대상으로생성되었습니다. 예상분자량 279-328

배경

이유전자가코딩하는단백질은DNA 결합전사인자로,근육특이적유전자 생성인자로도유전자및스트레스유도유전자를활성화합니다.이단백질은동종형체또는이종형체로작용할수있으며,근육발달,신경세포분화,세포생장조절및세포사멸을포함한여러과정에관여합니다.이유전자의결함은상염색체우성관상동맥질환 1 형(ADCAD1)의원인이될수있습니다.이유전자에대해서로다른아이소폼을인코딩하는여러전사변이체가발견되었습니다.[RefSeq 제공 2010 년1 월] 질병 MEF2A 의결함은심장혈통한상염색체우성관상동맥질환 1 형(ADCAD1) [MIM:608320]의원인일수있습니다. 기능 다른근육특이적유전자에서발견되는MEF2 요소

, 5'-YTA[AT](4)TAR-3'에특이적으로결합하는전사활성화인자입니다. 또한다음의생장인자및스트레스유도성전사활성화에관여합니다. 골격근및심근발달뿐만아니라신경세포분화및생존에도필수적입니다. 근육특이적및뇌특이적전사에p38 MAPK 신호전달을통해세포생장, 생존및세포사멸조절에중요한역할을합니다. 소니폐신경펩타이드의활성화는MEF2A 는NUR77 의전사를억제하여세포스트레스를증폭합니다(PTM: Lys-403 의아세틸화는전사활성을활성화합니다. 분화는심근세포에p300 에의해아세틸화됩니다. Lys-4 의아세틸화는DNA 결합및전사활성을증가시킵니다(유성가준). p300 에의한아세틸화는심근세포생존촉진및심장을유발합니다(PTM: Ser-408 의자발적인산화는Lys-403 의탈아세틸화를촉진하여이러한아세틸화를방해합니다. 칼시뉴린은PPP3CA 에의한 Ser-408 의탈인산화는Lys-403 잔기에서탈아세틸화를촉진하여세포를분화로유도합니다. Thr-312 및Thr-319 의인산화는p38 MAPK 신호전달에관여하는중요한이펙터전사를활성화합니다). 이러한MAPK14/p38alpha 및MAPK11/p38beta 에의해선택적,MAPK13/p38delta 또는MAPK12/p38gamma 에의해는선택적이지않습니다. 신경특성에의해유도된CDK5 에의한Ser-408 인산화는MEF2A 전사활성을억제하여프로신경세포사멸을유발합니다. Thr-312, Thr-319 및Ser-355 인산화는EGF 에의해유도될수있습니다. PTM: 신경특성후소니펩신경펩타이드caspase 3 및caspase 7 에의해이러한세포분화로절단됩니다. 특히CDK5 매개인산화형태는유전적으로절단하여신경펩타이드사멸및전사활성을유발합니다. PTM: Lys-403 의수동화는PIAS1 에의해강력하게전사활성을억제합니다. Ser-408 에의인산화는수동화에필수적입니다. 핵유지나DNA 결합에는영향을미치지않습니다. SUMO1 에의해 그리고 SUMO2 와SUMO3 에의해도이루어질수동화됩니다. PIASx 는소니펩신사냅스후수상돌기에서수동화를촉진하고그형태형성을유발합니다. 유성MEF2 계열에속합니다. 유성1 개의MADS-box 모티프를포함합니다. 유성1 개의Mef2 형DNA 결합모티프를포함합니다. 소규모 동종또는이종이량체DNA 에결합합니다. MEF2D 와이량체형성합니다. HDAC7 과상호작용합니다(유성에의해). PIAS1 과상호작용하여 이상호작용은수동화를촉진합니다. HDAC4, HDAC9 및SLC2A4RG 와상호작용합니다. MAPK7 과(N-말단을통해) 상호작용합니다. 여한상호작용MEF2A 의인산화및전사활성을유발합니다. 조직특성MEF2 및MEFA 동형단백질은골격, 심근및뇌에한정발현되는반면, RSRFC4 및RSRFC9 동형단백질은조혈조직에서발현됩니다.

연구 분야

AMPK; 단백질아세틸화

이미지 데이터



파라핀에포매된간암환자조직에대한면역조직화학분석(MEF2A(Phospho-Thr312) 항체사용. 오른쪽그림은안티펩타이드로차단한 결과입니다.



PMA 로처리한NIH/3T3 세포용해물을MEF2A(Phospho-Thr312) 항체를사용하여웨스턴블롯분석했습니다. 왼쪽레인은안티펩타이드로차단했습니다.