제품명: SNAI 1 (인산화 **Ser246)** 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab05454
연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
반응성	인간, 쥐, 원숭이
결합	비결합
변형	인산화된
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보존제 0.5%, 방부제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	친화성 정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:10000
분자량	29kDa

항원 정보

유전자명	SNAI1
다른 이름	SNAI1; SNAH; Zinc finger protein SNAI1; Protein snail homolog 1; Protein sna
유전자 ID	6615.0
SwissProt ID	O95863
면역원	이 항체는 Ser246 인산화 부위 주변의 인간 SNAI1 유래 합성 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 에피토프 범위 215-264

배경

SNAI1(snail family transcriptional repressor 1)은 척추동물 Snail 과의 한 구성원입니다. 이 단백질은 중배엽 내배엽 형성 및 부분을 억제합니다. 이 단백질은 핵 단백질로 Snail 단백질 과 주로 유사하며 발생 중 배아 중배엽 형성에 중요한 역할을 하는 것으로 여겨집니다. 2 번 염색체 유한 가족 유전자 변이로 두 개 이상 발견되었습니다. [RefSeq 제공, 2008 년 7 월] 이 유전자는 중배엽 형성에 관여하는 것으로 보입니다. E-카드헤린 전사 억제제 3 개. E-박스에 결합하여 전사를 억제합니다. 유전자 돌연변이 C2H2 형 아연 손가락 단백질 계열에 속합니다. 유전자 4 개. C2H2 형 아연 손가락

을 포함합니다. 조직 특성 다형한 조직에서 발현하며 신장에서 가장 높은 발현을 보입니다.

연구 분야

접착점

이미지 데이터



SNAI1(Phospho-Ser246) 항체를 사용한 면역원 인산화 펩타이드(Phospho-left) 및 비인산화 펩타이드(Phospho-right)에 대한 효소 결합 면역흡착 분석법(Phospho-ELISA)



SNAI1(Phospho-Ser246) 항체를 이용한 HUVEC 세포의 면역형광 분석. 오른쪽 그림은 인산화 펩타이드로 차단한 그림입니다.



SNAI1(Phospho-Ser246) 항체를 사용하여 HT29 세포 용해물을 웨스턴 블롯 분석합니다. 오른쪽 레인은 인산화 펩타이드로 차단합니다.



HT29 COS7 세포를 대상으로 인산화 SNAI 1(S246) 다클론 항체 1:500 으로 희석하여 웨스턴 블롯 분석을 수행했다.