제품명: Cdc40 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab08516
연구용 전용

요약

설명	토끼다클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
반응성	인간,쥐,생쥐
결합	비결합
변형	수정되지않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤50%, 보호단백질0.5%, 신규방부제N 0.02%를함유한PBS 용액
정제	친화성정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:20000-1:40000
분자량	66kDa

항원 정보

유전자명	CDC40
다른 이름	CDC40; EHB3; PRP17; PRPF17; Pre-mRNA-processing factor 17; Cell division cycle 40 homolog; EH-binding protein 3; Ehb3; PRP17 homolog; hPRP17
유전자 ID	51362.0
SwissProt ID	O60508
면역원	이항혈청은인간CDC40 에서유래한합성펩타이드를사용하여생성되었습니다. 예상상동성 179-228

배경

전령RNA(pre-mRNA) 스플라이싱은두단계의연속적인에스테르교환반응을통해일어납니다. 이과정에서핵은단백질pre-mRNA 스플라이싱과정의첫번째단계에 필수적인것으로보고되었습니다. 이단백질은스플라이소좀에존재하며 단백질-단백질상호작용에관여하는 7 개의WD 반복서열을포함하고있습니다. 이단백질은효모Prp17 단백질과유사성을가지고있는데Prp17 단백질은pre-mRNA 스플라이싱과정의

라는 두 가지 서로 다른 세포 과정에 관여합니다. 따라서 이 단백질은 세포 주기 진행에 중요한 역할을 할 가능성이 있습니다. [RefSeq 제공, 2008 년 7 월], 기능: 스플라이싱 경로 후반에 스플라이소좀과 연관되며, 전령 RNA(pre-mRNA) 스플라이싱의 두 번째 단계에서 기능할 수 있습니다. 유사성: 7 개의 WD 반복 서열을 포함합니다. 소단위: 스플라이소좀 C 복합체에서 확인되었으며, 적어도 AQR, ASCC3L1, C19orf29, CDC40, CDC5L, CRNKL1, DDX23, DDX41, DDX48, DDX5, DGCR14, DHX35, DHX38, DHX8, EFTUD2, FRG1, GPATC1, HNRPA1, HNRPA2B1, HNRPA3, HNRPC, HNRPF, HNRPH1, HNRPK, HNRPM, HNRPR, HNRPU, KIAA1160 으로 구성됩니다. KIAA1604, LSM2, LSM3, MAGOH, MORG1, PABPC1, PLRG1, PNN, PPIE, PPIL1, PPIL3, PPWD1, PRPF19, PRPF4B, PRPF6, PRPF8, RALY, RBM22, RBM8A, RBMX, SART1, SF3A1, SF3A2, SF3A3, SF3B1, SF3B2, SF3B3, SFRS1, SKIV2L2, SNRPA1, SNRPB, SNRPB2, SNRPD1, SNRPD2, SNRPD3, SNRPE, SNRPF, SNRPG, SNW1, SRRM1, SRRM2, SYF2, SYNCRIP, TFIP11, THOC4, U2AF1, WDR57, XAB2 및 ZCCHC8.,

연구 분야

스플라이소좀

이미지 데이터



K562, COLO 및 HUVEC 세포 용해물을 CDC40 항체를 사용하여 웨스턴 블롯 분석했습니다. 오른쪽 레인은 합성 펩타이드로 차단했습니다.



파라핀에 포매된 인간 뇌 조직의 면역조직화학 분석, 항체는 1:100 으로 희석하여 4°C 에서 하룻밤 동안 반응시켰다. 항원 회복에는 고압과 Tris-EDTA, pH 8.0 용액을 사용하였다. 음성 대조군(오른쪽)은 항체를 면역원 펩타이드로 전처리하여 얻었다.