제품명: DNA pol ζ 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab10061
연구용 전용

요약

설명	토끼다클론항체
숙주	토끼
적용	IHC,ICC/IF,ELISA
반응성	인간,쥐
결합	비결합
변형	수정되지않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤50%, 보호단백질0.5%, 신규방부제N 0.02%를함유한PBS 용액
정제	친화성정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:10000-1:20000
분자량	-

항원 정보

유전자명	REV3L
다른 이름	REV3L; POLZ; REV3; DNA polymerase zeta catalytic subunit; Protein reversionless 3-like; REV3-like; hREV3
유전자 ID	5980.0
SwissProt ID	O60673
면역원	이항혈청은안티DNA 중합효소재에서유래한합성펩타이드를사용하여생성되었습니다. 예비신청위치231-280

배경

촉매활성 대부분단백질은 DNA(n) + 다른펩타이드 = DNA(n+1)., 또한C-말단부분은뉴클레오티드중합과정에서핵심역할을할수있으며N-말단부분은손상된DNA 합성과정에서다른안티파단백질단백질상호작용을위한부위를제공할수있습니다. 유성DNA 중합효소B 형계열에속합니다. 소단위REV7 과상호작용합니다. 조직특성 널리발현됩니다. 촉매활성 대부뉴클레오티드다른펩타이드

+ DNA(n) = 다중화된+ DNA(n+1)., 또한 C-말단 부분은 누클레오티드 중합과정에서 템플레이트 의존적 활성을 할 수 있었지만 N-말단 부분은 손상된 DNA 합성과정에서 다른 인자들과 단백질-단백질 상호작용을 위한 부위를 제공할 수 있습니다. 유성 DNA 중합효소 B 형계열에 속합니다. 또한 REV7 과 상호작용합니다. 조직특성 높게 발현됩니다. 표현합니다.

연구 분야

-

이미지 데이터



파라핀에 포매된 인간 뇌조직에 대한 DNA 중합효소 제타 항체를 이용한 면역조직화학분석. 오른쪽 그림은 항원펩타이드로 차단한 결과입니다.