제품명: HIF-3α 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab12026
연구용 전용

요약

설명	토끼다클론항체
숙주	토끼
적용	WB,ELISA
반응성	인간,쥐,생쥐
결합	비결합
변형	수정되지않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤50%, 보호단백질0.5%, 신규방부제N 0.02%를함유한PBS 용액
정제	친화성정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000
분자량	72kDa

항원 정보

유전자명	HIF3A
다른 이름	Hypoxia-inducible factor 3-alpha; HIF-3-alpha; HIF3-alpha; Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP7; Class E basic helix-loop-helix protein 17; bHLHe17; HIF3-alpha-1; Inhibitory PAS domain protein; IPAS; Member of PAS protein 7; PAS domain-c
유전자 ID	64344.0
SwissProt ID	Q66K72
면역원	이항체는인간HIF-3 알파에서유래한합성펩타이드를사용하여생성되었습니다. 예상분자량305-354

배경

저산소유도인자3 알파소단위(HIF3A) (인간 이유전자에의해코딩된단백질은저산소증(저산소상태)에대한세포적응반응을조절하는역할을하며베타소단위이중항체전사인자증하인알파3 소단위입니다.알파3 소단위는알파

-1 또는 알파2 소단위를 포함하는 인자에서 발견되는 전사 활성화 도메인이 없습니다. 알파3 소단위를 포함하는 인자는 저산소 유도 유전자 발현의 음성 조절자로 여겨집니다. 이 유전자에는 여러 대체 스플라이싱 전사 변이체가 존재합니다. [RefSeq 제공, 2011 년 3 월]. 기능: 저산소증에 대한 적응 반응에 관여합니다. HIF1A 및 EPAS1 의 저산소 유도 발현을 억제합니다. 표적 유전자 프로모터의 저산소 반응 요소(HRE) 내의 핵심 DNA 서열 5'-TACGTG-3'에 결합합니다. HIF3A-ARNT 복합체는 HRE 에 의해 유도되는 리포터 유전자의 전사를 활성화합니다. 아이소폼 4 는 HIF1A 매개 전사를 억제하는 우성 음성 기능을 가지고 있습니다. 아이소폼 4 는 HIF1A 와 저산소 반응 요소(HRE)의 결합을 약화시켜 HRE 유도 전사를 억제합니다. 저산소증은 아이소폼 4 의 발현을 감소시켜 저산소 상태에서 HIF1A 를 활성화시킵니다. 반대로 정상 산소 상태로 회복되면 아이소폼 4 의 발현이 증가하여 HIF1A 활성을 억제합니다. 아이소폼 4 는 신장에서 저산소 유도 유전자 발현의 음성 조절자일 수 있으며 신장 종양 발생에 관여할 가능성이 있습니다. 각막의 혈관 신생 억제 인자로 작용합니다. 유도: 저산소증(1% O(2))에 의해 단백질 안정성 및 전사 활성화 증가로 인해 단백질 및 mRNA 수준 모두에서 강하게 유도됩니다. 온인 정보: 저산소 유도 인자 항목; PTM: 정상 산소 상태에서 PHD 에 의해 산소 의존성 분해 도메인(ODD)의 Pro-492 에서 수산화됩니다. 수산화된 프롤린은 VHL 과의 상호작용을 촉진하여 빠른 유비퀴틴화 및 후속 프로테아좀 분해를 시작합니다. 유사성: 1 개의 기본 헬릭스-루프-헬릭스(bHLH) 도메인을 포함합니다. 유사성: 2 개의 PAS(PER-ARNT-SIM) 도메인을 포함합니다. 세포 내 위치: 모든 문맥 주변 및 정맥 주변 간세포의 핵에 존재합니다. 말단 정맥 주위 영역에서 간세포의 세포질에서 검출됨. 소단위: ARNT 와 이종이량체를 형성함. 산소 의존성 분해 도메인(ODD)을 통해 VHL 의 베타 도메인과 상호작용함. 조직 특이성: 신장에서 발현됨. 폐 상피 세포에서 풍부하게 발현됨. 발현은 산소 의존적으로 조절됨.

연구 분야

-

이미지 데이터



쥐 뇌 세포 용해물을 HIF-3α 항체를 사용하여 웨스턴 블롯 분석하였다.