


클로니다제에 항응고제이며 페라틴5' 모노페이트의 침입을 촉진한다. 이 유전자 클론은 유전자 5'-모노페이트가 분해소 결합으로 인한 활성 분할 원인이 된다. 이 유전자 클론은 여러 활성 분할 단계 스펙트럼에서 변형이 관찰되며, 이 유전자의 유전자 3' 및 4' 변형이 존재에 포함된다. [RefSeq 서열 2012년 3월, 최형철 5'-리뉴클레오타이드+ H(2)O = 리뉴클레오타이드+ 인산, 질병 NT5C3의 결합 P5N 결합 (MIM:266120)의 원인이 된다. P5N 결합으로 인한 활성 분할은 UMPH1 결합으로 인한 활성 분할과도 포함된다. P5N 결합은 결합 내적인 활성 분할과 높은 페라틴 클로니다제 주사는 공통되는 활성 분할을 유발하는 생체 열 결합이다. 남중으로 인한 활성 분할이 있어 활성 분할도 연결 가능하다. 가능 뉴클레오타이드 모노페이트 클로니다제 모두 사용할 수 있다. 유전자 클론은 뉴클레오타이드 클론 Raji 세포에서 인체 유전자 클론에 해당된다. 유성 페라틴 5'-뉴클레오타이드가 결합한다. 소위 단량체 조특성 아미노산 1과 2 아미노산 3은 활성 분할의 결과로 발생된다. 아미노산 4는 활성 분할에만 발생된다.


연구 분야

퓨린다제, 페라틴다제, 나트륨염 및 나트륨염다제


이미지 데이터



NT5C3 항체 사용 후 페라틴다제에 노출된 세포의 활성 분할 촉진. 오른쪽은 활성 분할이 촉진된 결과이다.



Jurkat 및 COLO205 세포를 사용하여 NT5C3 항체 사용에 의한 활성 분할 촉진. 오른쪽은 활성 분할이 촉진된 결과이다.



NT5C3 항체 사용 후 293 세포를 사용하여 활성 분할 촉진.