제품명: RANTES 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab16888
연구용 전용

요약

설명	토끼다클론항체
숙주	토끼
적용	IHC,ICC/IF,ELISA
반응성	인간,쥐,생쥐
결합	비결합
변형	수정되지않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤50%, 보호단백질0.5%, 신규방부제N 0.02%를함유한PBS 용액
정제	친화성정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:20000-1:40000
분자량	-

항원 정보

유전자명	CCL5
다른 이름	CCL5; D17S136E; SCYA5; C-C motif chemokine 5; EoCP; Eosinophil chemotactic cytokine; SIS-delta; Small-inducible cytokine A5; T cell-specific protein P228; TCP228; T-cell-specific protein RANTES
유전자 ID	6352.0
SwissProt ID	P13501
면역원	이항체는인간RANTES 에서유래한합성펩타이드를사용하여생성되었습니다. 예상분자량 35-84

배경

이유전자는 17 번염색체q-팔에클러스터에위치한유전자중하나입니다.케모카인은면역조절및염증과관련된분비단백질의대규모패밀리를형성합니다.이유전자에의해인코딩된단백질은소형분비형N-말단시스테인잔기쌍에대해케모카인

패밀리에 속합니다. CC 하위 패밀리에 속하는 이 케모카인은 혈액 단핵구, 기억 T 도우미 세포 및 호산구에 대한 화학유인 물질로 작용합니다. 또한 호염기구에서 히스타민 방출을 유발하고 호산구를 활성화합니다. 이 사이토카인은 CD8+ 세포에서 생성되는 주요 HIV 억제 인자 중 하나입니다. 케모카인 수용체인 케모카인 (C-C 모티프) 수용체 5(CCR5)의 천연 리간드 중 하나로 작용하며, CCR5를 보조 수용체로 사용하는 HIV-1 R5 균주의 시험관 내 복제를 억제합니다. 대체 스플라이싱으로 인해 여러 전사 변이체가 생성되며, 이들은 다음과 같은 기능을 수행합니다: 혈액 단핵구, 기억 T 도우미 세포 및 호산구에 대한 화학유인 물질. 호염기구에서 히스타민 방출을 유발하고 호산구를 활성화합니다. CCR1, CCR3, CCR4 및 CCR5에 결합합니다. CD8+ T 세포에서 생성되는 주요 HIV 억제 인자 중 하나입니다. 재조합 RANTES 단백질은 HIV-1, HIV-2 및 원숭이 면역결핍 바이러스(SIV)의 다양한 균주에 대해 용량 의존적인 억제 효과를 유도합니다. 가공된 형태인 RANTES(3-68)는 천연 화학주성 억제제로 작용하며 HIV-1 감염에 대한 더욱 강력한 억제제입니다. 두 번째 가공 형태인 RANTES(4-68)는 RANTES(1-68) 및 RANTES(3-68)에 비해 화학주성 및 HIV 억제 활성이 감소되어 있으며, 단핵구와 호중구와 관련된 미확인 효소에 의해 생성됩니다. 유도: 미토겐에 의해 유도됩니다. 질량 분석: PubMed:1380064, 질량 분석: PubMed:15923218, 질량 분석: O-글리코실화 PubMed:1380064, 온라인 정보: RANTES 항목, 다형성 변이체 Phe-24는 케모카인 수용체 CCR1 및 CCR3의 결합체입니다. PTM: N-말단 가공 형태인 RANTES(3-68)는 말초 혈액 백혈구 및 배양된 육종 세포에서 분비된 후, 아마도 DPP4에 의한 단백질 분해에 의해 생성됩니다. 서열: PTM: Ser-27 및 Ser-28의 O-결합 당류의 정체는 PubMed:1380064에 보고되지 않았습니다. 유사성을 기준으로 지정되었습니다. 유사성: 인터크린 베타(케모카인 CC) 계열에 속합니다. 조직 특이성: T 세포 및 대식세포 특이적입니다.

연구 분야

사이토카인, 사이토카인 수용체 상호작용, 케모카인, 톨 유사 수용체, NOD 유사 수용체, 세포질 DNA 감지 경로, 프리온 질환, 헬리코박터 파일로리 감염 시 상피세포 신호전달

이미지 데이터



파라핀에 포매된 인간 폐암 조직에서 RANTES 항체의 면역조직화학 분석.