

. DNA 손상 ATM 또는 ATR 에 의해 인산화됨 유점 단백질 키아제 수퍼패밀리에 속함 CAMK Ser/Thr 단백질 키아제 패밀리에 속함 유점 2 개의 티로신 III 형도메일도함 유점 2 개의 단백질 키아제도메일도함 유점 9 개의 Ig 유(면역글로불린)가 도메일도함 소단위 아슬로3 은 단백질 또는 중량형은 결합 조직 특성 아슬로1 은 항문에서 유적으로 발현됨 아슬로3 과 같은 비키아제형은 주로 대장에서 발현됨 아슬로3 은 정상 혈색의 고분획된 ASMC 에서는 발현되는 것으로 보이며 상처에 발현됨 ASMC 에서는 발현이 감퇴됨 혈색에 반응하여 혈관 평활세포 (ASMC)는 혈관이 정상 상외 수축 표형에서 증식 및 혈색 표형으로 변함이다. 이러한 혈관 평활세포의 증식은 동맥경증의 발생과 관련이 있다.

연구 분야

심혈관계 혈관계 혈관표지자 분석

이미지 데이터



과립도 및 인산염 조차면역조직화학 분석 1. 항원화물 위해 Tris-EDTA, pH 9.0 용액 사용했다. 2. 항체 1:200 으로 희석하여 4°C 에서 48시간 동안 반응했다. 3. 이차 항체 1:200 으로 희석하여 슬라이드에서 45 분 동안 반응했다.