제품명: SR-2A 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab18247
연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC,ICC/IF,ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보호단백질 0.5%, 산화방지제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	친화성 정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:10000
분자량	-

항원 정보

유전자명	HTR2A
다른 이름	HTR2A; HTR2; 5-hydroxytryptamine receptor 2A; 5-HT-2; 5-HT-2A; Serotonin receptor 2A
유전자 ID	3356.0
SwissProt ID	P28223
면역원	이 항체는 인간 5-HT-2A 에서 유래한 합성 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 에피토프 범위 422-471

배경

이 유전자는 다양한 역할을 하는 신경 전달 물질 세로토닌 수용체 중 하나를 암호화합니다. 이 유전자의 돌연변이는 정신분열증 및 양극성 장애에 대한 감수성과 관련이 있으며 주요 우울증(MDD) 환자의 혈소판 세로토닌 수준과도 관련이 있습니다. 이 유전자의 돌연변이 2 에 돌연변이가 있는 MDD 환자는 세로토닌에 대한 반응이 현저히 감소하는데, 이는 세로토닌이 이 유전자 산물을 활성화할 때 필요합니다. 이 유전자에는 서로 다른 아이소폼을 암호화하는 여러 개의 대체 스플라이스 변이체가 발견되었습니다. [RefSeq 제공, 2009 년 9 월] 또한 PDZ 도메인 함유 단백질 NADL, CASK, APBA1, DLG1 및 DLG4 와 상호작용하는 것으로 입증되었습니다. 기능: 이 신경전달물질 수용체는 혈소판 응집과

이는 생체 호르몬인 5-하이드록시트립타민(세로토닌)의 여러 수용체 중 하나입니다. 이 수용체는 포스파티딜이노시톨-칼슘 이차 신호 전달 시스템을 활성화하는 G 단백질과의 결합을 통해 작용합니다. 이 수용체는 기관 평활근 수축, 기관지 수축 및 알도스테론 생성 조절에 관여합니다. 온라인 정보: 세로토닌 수용체 돌연변이 및 다형성 데이터베이스, 유사성: G 단백질 결합 수용체 1 계열에 속합니다. 세포 내 위치: 축삭, 수상돌기, 시냅스 이후, 시냅스 전, 후부에 위치합니다. 소단위: MPDZ 및 INADL과 상호작용합니다. MPP3, PRDX6, DLG4, DLG1, CASK, APBA1 및 MAGI2와 상호작용할 수 있습니다.

연구 분야

칼슘, 신경활성 리간드-수용체 상호작용, 간극 연접

이미지 데이터



5-HT-2A 항체를 이용한 A549 세포의 면역형광 분석. 오른쪽 그림은 합성 펩타이드로 차단한 결과입니다.



파라핀에 포매된 인간 뇌 조직에 대한 면역조직화학 분석(5-HT-2A 항체 사용). 오른쪽 사진은 합성 펩타이드로 차단한 결과입니다.