**제품명: TPH2** 토끼 다클론 항체
**카탈로그 번호: APRab19155**
연구용 전용

## 요약

| | |
|---|---|
| **설명** | 토끼다클론항체 |
| **숙주** | 토끼 |
| **적용** | WB,ELISA |
| **반응성** | 인간,쥐,생쥐,원숭이 |
| **결합** | 비결합 |
| **변형** | 수정되지않음 |
| **아이소타입** | IgG |
| **클론성** | 다클론 |
| **형태** | 액체 |
| **농도** | 1mg/ml |
| **Storage** | *Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.* |
| **Shipping** | Ice bags |
| **버퍼** | 글리세롤50%, 보호단백질0.5%, 신규방부제N 0.02%를함유한PBS 용액 |
| **정제** | 친화성정제 |

## 적용

| | |
|---|---|
| **희석 비율** | WB 1:500-1:2000,ELISA 1:20000-1:40000 |
| **분자량** | 56kDa |

## 항원 정보

| | |
|---|---|
| **유전자명** | TPH2 |
| **다른 이름** | TPH2; NTPH; Tryptophan 5-hydroxylase 2; Neuronal tryptophan hydroxylase; Tryptophan 5-monooxygenase 2 |
| **유전자 ID** | 121278.0 |
| **SwissProt ID** | Q8IWU9 |
| **면역원** | 이항체는인간TPH2 에서유래한합성펩타이드를사용하여생성되었습니다. 예상분자량 4-53 |

## 배경

이유전자는프테린의존성방향족아미노산수산화효소계열의구성원을암호화합니다.암호화된단백질은중간호르몬세로토닌의생합성에관여하는속도제한단계를촉매합니다.이유전자의돌연변이는우울증과같은정신질환과관련될수있습니다.[RefSeq 제공, 2016 년2 월], 촉매활성:L-트립토판+ 테트라하이드로프테린+ O(2) = 5-하이드록시-L-트립토판+ 4α-하이드록시테트라하이드로프테린, 보조인자

Fe(2+) 이온. 질병: TPH2 의 유전적 변이는 주요 우울 장애(MDD)에 대한 감수성에 영향을 미칠 수 있습니다[MIM:608516]. 경로: 방향족 화합물 대사; 세로토닌 생합성; L-트립토판으로부터 세로토닌 생성: 1/2 단계, 유사점: 비오프테린 의존성 방향족 아미노산 수산화효소 계열에 속함. 유사점: ACT 도메인 1 개를 포함함. 조직 특이성: 뇌 특이적

## 연구 분야

트립토판 대사

## 이미지 데이터




TPH2 항체를 사용하여 HUVEC 세포 용해물을 웨스턴 블롯 분석했습니다.




HeLa 세포에 대한 TPH2 다클론 항체를 사용한 웨스턴 블롯 분석. 1차 항체는 1:20000 으로 희석하였다.