제품명: UBE3B 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab19534
연구용 전용

요약

설명	토끼다클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
반응성	인간,쥐,마우스
결합	비결합
변형	수정되지않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤50%, 보호단백질0.5%, 산화방지제N 0.02%를함유한PBS 용액
정제	친화성정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:20000
분자량	123kDa

항원 정보

유전자명	UBE3B
다른 이름	UBE3B; Ubiquitin-protein ligase E3B
유전자 ID	89910.0
SwissProt ID	Q7Z3V4
면역원	이항체는인간UBE3B 에서유래한합성펩타이드를사용하여생성되었습니다. 예상분자량 581-630

배경

유비퀴틴을이용한단백질분해는비정상적이거나수명이짧은단백질을분해하는정상적인과정에필수적입니다. 유비퀴틴화에는적어도세가지종류의효소가관여합니다. 바로E1 유비퀴틴활성화효소, E2 유비퀴틴접합효소, 그리고 E3 유비퀴틴단백질리가아제입니다. 이중에서E3 유비퀴틴접합효소가기질에속하는단백질을인식하며, 이효소는E2 유비퀴틴접합효소로부터유비퀴틴을받아표적단백질에유비퀴틴을전달합니다. 이단백질군의특징은C 말단에있는 HECT(E6-AP C 말단상동성) 또한은유비퀴틴전달의최종부위에서E2 접합효소와복합체를형성합니다. 따라서C 말단HECT 또한이없는이단백질군은특징은E2 효소와결합하지않습니다. 이유전자에서부

다른 안정을 입증하는 데 사용할 수 있습니다. [기능] E2 유비퀴틴 접합 효소로 작용하는 것 외에도 E3 유비퀴틴 단백질 리가제 활성도 보유하고 있습니다. 단백질 유비퀴틴화, 유성 1 개의 HECT(E6AP 형 E3 유비퀴틴 단백질 리가제 모티프를 포함. 유성 1 개의 IQ 모티프를 포함. 조직 특성 광범위하게 발현

연구 분야

유비퀴틴 매개 단백질 분해

이미지 데이터



Jurkat 세포 용해물을 UBE3B 항체를 사용하여 웨스턴 블롯 분석했습니다. 오른쪽 레인은 항원 펩타이드로 차단했습니다.