제품명: 페릴리핀 **A (16W12)** 토끼 단클론 항체
카탈로그 번호: AMRe15973
연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB,ICC/IF
반응성	인간, 쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	토끼 IgG 는 인산염 완충 용액(pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 안정화 보존제 N 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다. 단기 보관시 +4°C 에서, 장기 보관시 -20°C 에서 보관하십시오. 냉동/해동 과정을 반복하지 마십시오.
정제	친화성 정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000,ICC/IF 1:100-1:200
분자량	56kDa

항원 정보

유전자명	PLIN1
다른 이름	Lipid droplet associated protein; PERI; Perilipin-1; PerilipinA; LIN1;
유전자 ID	5346.0
SwissProt ID	O60240
면역원	인간 페릴리핀 1 의 합성 펩타이드

배경

지방세포 지질 대사의 조절자. 지질 저장소를 코팅하여 호르몬 민감성 리파아제(HSL) 에 의한 분해로부터 보호합니다. 결핍시 마른 체형을 유발할 수 있습니다. 지방세포 지질 대사의 조절자로서, 지질 저장소를 코팅하여 호르몬 민감성 리파아제(HSL) 에 의한 분해로부터 보호합니다. 결핍시 마른 체형을 유발할 수 있습니다. CIDEC 를 활성화하여 단일 소포 지질 형성에 관여합니다. 이를 상호작용은 지질 소포의 크기 증가 및 형성되는 순중성 지질 이동을 촉진합니다. 지방분해 및 모유

라세트수를조절할수있습니다.

연구 분야

신경과학

이미지 데이터

분석 결과는 자극에 대한 개체의 반응 A 단편 패턴과 행동 간격에 따라 다른