

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón ERK1/2**Nº de Catálogo: AMM85038**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,5% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
Peso Molecular	Calculated MW: 44,42 kDa; Observed MW: 44,42 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	ERK1/2 MAPK3; ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-
Nombres Alternativos	ERK1; p44-MAPK; MAPK1; ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK.
ID del Gen	5595/5594
ID SwissProt	P27361/P28482
Inmunógeno	Péptido sintético conjugado con KLH.


Antecedentes

La serina/treonina quinasa actúa como un componente esencial de la vía de transducción de señales de la MAP quinasa. MAPK1/ERK2 y MAPK3/ERK1 son las dos MAPK que desempeñan un papel importante en la cascada MAPK/ERK. También participan en una cascada de señalización iniciada por la activación de KIT y KITLG/SCF. Dependiendo del contexto celular, la cascada MAPK/ERK media diversas funciones biológicas, como el crecimiento celular, la adhesión, la supervivencia y la diferenciación, mediante la regulación de la transcripción, la traducción y los reordenamientos del citoesqueleto.


Área de Investigación

-


Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de ERK1/2 en lisados de HeLa, C6 utilizando el anticuerpo ERK1/2



Análisis de transferencia Western de ERK1/2 en cerebro de ratón, cerebro de rata y lisados de HeLa utilizando el anticuerpo ERK1/2.



Análisis inmunohistoquímico del carcinoma de mama humano incluido en parafina utilizando el anticuerpo ERK1/2. Se utilizó citrato de sodio a alta presión y temperatura, pH 6,0, para la recuperación del antígeno.