

**Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo USP11****Nº de Catálogo: APRab00254**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo policlonal de conejo
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,ICC/IF,FC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Policlonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	IgG de conejo en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, 150 mM de NaCl, 0,02 % de azida sódica y 50 % de glicerol.
<b>Purificación</b>	Cromatografía de afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,ICC/IF 1:50-1:200,FC 1:50-1:100,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 110 kDa; Observed MW: 110 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	USP11
<b>Nombres Alternativos</b>	UHX1; USP11
<b>ID del Gen</b>	8237
<b>ID SwissProt</b>	P51784
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de USP11 humano

**Antecedentes**


Proteasa que puede eliminar la ubiquitina conjugada de las proteínas diana y las cadenas de poliubiquitina. Inhibe la

degradación de las proteínas diana por el proteasoma. Participa en la regulación de las vías que conducen a la activación del NF- $\kappa$ B. Participa en la regulación de la reparación del ADN tras roturas de la doble cadena de ADN.

## Área de Investigación

Epigenética y señalización nuclear

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de USP11 en (1) lisados de HEK293; (2) lisados de testículo de ratón utilizando el anticuerpo USP11.