

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo VDR (fosfo Ser51)**Nº de Catálogo: APRab05619**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Fosforilado
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:10000-1:20000
Peso Molecular	38kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	VDR
Nombres Alternativos	VDR; NR111; Vitamin D3 receptor; VDR; 1; 25-dihydroxyvitamin D3 receptor; Nuclear receptor subfamily 1 group I member 1
ID del Gen	7421.0
ID SwissProt	P11473
Inmunógeno	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado del receptor de vitamina D3 humano, alrededor del sitio de fosforilación de Ser51. Rango de AA: 16-65.


Antecedentes

Este gen codifica el receptor nuclear de la hormona de la vitamina D3. Este receptor también funciona como receptor del ácido litocólico, un ácido biliar secundario. El receptor pertenece a la familia de factores reguladores de la transcripción que actúan en trans y muestra similitud de secuencia con los receptores de las hormonas esteroideas y tiroidea. Los objetivos posteriores de este receptor nuclear de la hormona participan principalmente en el metabolismo mineral, aunque el receptor regula diversas otras vías metabólicas, como las implicadas en la respuesta inmunitaria y el cáncer. Las mutaciones en este gen se asocian con el raquitismo resistente a la vitamina D de tipo II. Un polimorfismo de un solo nucleótido en el codón de iniciación da como resultado un sitio de inicio de la traducción alternativo tres codones aguas abajo. El empalme alternativo da como resultado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes proteínas. [proporcionado por RefSeq, febrero de 2011], precaución: No se sabe con certeza si Met-1 o Met-4 es el iniciador., enfermedad: Los defectos en el VDR son la causa del raquitismo de tipo IIA [MIM:277440]; También conocido como raquitismo hipocalcémico resistente a la vitamina D (HVDRR). El HVDRR es, con mayor frecuencia, un trastorno autosómico recesivo que se caracteriza por raquitismo grave, hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario. Dominio: Compuesto por tres dominios: un dominio N-terminal modulador, un dominio de unión al ADN y un dominio C-terminal de unión a esteroideas. Función: Receptor de hormonas nucleares. Factor de transcripción que media la acción de la vitamina D3 controlando la expresión de genes sensibles a hormonas. Regula la transcripción de genes sensibles a hormonas mediante su asociación con el complejo WINAC, un complejo de remodelación de la cromatina. Se recluta a los promotores mediante su interacción con la subunidad BAZ1B/WSTF del complejo WINAC, que media la interacción con histonas acetiladas, un paso esencial para la asociación VDR-promotor. Desempeña un papel central en la homeostasis del calcio. Información en línea: Base de datos de mutaciones y polimorfismos humanos de Singapur. Polimorfismo: Las variaciones genéticas en el VDR pueden determinar la susceptibilidad a Mycobacterium tuberculosis [MIM:607948]. Similitud: Pertenece a la familia de receptores hormonales nucleares, subfamilia NR1. Similitud: Contiene un dominio de unión al ADN del receptor nuclear. Subunidad: Homodímero en ausencia de vitamina D3 unida. Heterodímero con RXRA tras la unión de la vitamina D3. Interactúa con SMAD3. Interactúa con los coactivadores MED1, NCOA1, NCOA2, NCOA3 y NCOA6, lo que provoca un fuerte aumento de la transcripción de genes diana. Interactúa (de forma ligando-dependiente) con BAZ1B/WSTF.


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de inmunotransferencia de lisados de células COLO205 tratadas con insulina 0,01 U/ml 15', utilizando el anticuerpo contra el receptor de vitamina D3 (fosfo-Ser51). El carril derecho está bloqueado con el péptido fosforilado.



Análisis Western Blot de células COLO usando el anticuerpo policlonal Phospho-VDR (S51) .