

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo tubulina α (acetil Lys352)**Nº de Catálogo: APRab06264**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,ELISA
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Acetilado
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000
Peso Molecular	50kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	TUBA1A/TUBA1B/TUBA1C/TUBA3C/TUBA4A/TUBA8 TUBA1A; TUBA3; Tubulin alpha-1A chain; Alpha-tubulin 3; Tubulin B-alpha-1; Tubulin alpha-3 chain; TUBA1B; Tubulin alpha-1B chain; Alpha-tubulin ubiquitous; Tubulin K-alpha-1; Tubulin alpha-ubiquitous chain; TUBA1C; TUBA6;Tubulin alpha-6 chain;
Nombres Alternativos	TUBA3C; TUBA2; TUBA3D; Tubulin alpha-3C/D chain; Alpha-tubulin 2; Alpha-tubulin 3C/D; Tubulin alpha-2 chain; TUBA4A; TUBA1; Tubulin alpha-4A chain; Alpha-tubulin 1; Testis-specific alpha-tubulin;
ID del Gen	7846.0

ID SwissProt

Q71U36

Inmunógeno

El antisuero se produjo contra el acetilpéptido sintetizado derivado de TUBA1B humano alrededor del sitio de acetilación de Lys352. Rango de AA: 311-360.


Antecedentes

Los microtúbulos del citoesqueleto eucariota desempeñan funciones esenciales y diversas, y están compuestos por un heterodímero de tubulinas alfa y beta. Los genes que codifican estos constituyentes microtubulares pertenecen a la superfamilia de las tubulinas, que se compone de seis familias distintas. Los genes de las familias de las tubulinas alfa, beta y gamma se encuentran en todos los eucariotas. Las tubulinas alfa y beta representan los componentes principales de los microtúbulos, mientras que la tubulina gamma desempeña un papel crítico en la nucleación del ensamblaje de los microtúbulos. Existen múltiples genes de tubulina alfa y beta, que están altamente conservados entre las especies. Este gen codifica la tubulina alfa y es muy similar a los genes Tuba1 de ratón y rata. Los estudios de Northern blotting han demostrado que la expresión génica se encuentra predominantemente en células neurológicas morfológicamente diferenciadas. Este gen es uno de los tres genes de alfa-tubulina en un grupo del cromosoma 12q. Enfermedad: Los defectos en TUBA1A son la causa de la lisencefalia tipo 3 (LIS3) [MIM:611603]. La LIS se caracteriza por una superficie cerebral lisa debido a la ausencia (agiria) o reducción (paquigiria) de circunvoluciones superficiales. A menudo se asocia con retraso psicomotor y convulsiones. Las características de la LIS3 incluyen agiria, paquigiria o heterotopía laminar, retraso mental grave, retraso motor, presencia variable de convulsiones y anomalías del cuerpo calloso, el hipocampo, el vermis cerebeloso y el tronco encefálico. Función: La tubulina es el principal componente de los microtúbulos. Se une a dos moles de GTP, uno en un sitio intercambiable de la cadena beta y otro en un sitio no intercambiable de la cadena alfa.,PTM:Sufre un ciclo de tirosinación/destirosinación, la eliminación cíclica y la readición de un residuo de tirosina C-terminal por las enzimas tubulina tirosina carboxipeptidasa (TTCP) y tubulina tirosina ligasa (TTL), respectivamente.,Similitud:Pertenece a la familia de las tubulinas.,Subunidad:Dímero de las cadenas alfa y beta.,Especificidad tisular:Se expresa a un alto nivel en el cerebro fetal.


Área de Investigación

Unión en hendidura; Infección por Escherichia coli patógena;


Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western del lisado de células K562, utilizando el anticuerpo TUBA1B (acetil-Lys352).



Análisis Western Blot de células K562, A549 y Jurkat utilizando el anticuerpo policlonal acetil-tubulina α (K352). El anticuerpo secundario se diluyó a 1:20000.



Análisis de Western blot de células K562 con anticuerpo policlonal acetil-tubulina α (K352). El anticuerpo secundario se diluyó a 1:20000.