

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo CD71**Nº de Catálogo: APRab08446**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
Reactividad	Humano, Rata, Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:10000-1:20000
Peso Molecular	85kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	TFRC
Nombres Alternativos	TFRC; Transferrin receptor protein 1; TR; TfR; TfR1; Trfr; T9; p90; CD71
ID del Gen	7037.0
ID SwissProt	P02786
Inmunógeno	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado de la región N-terminal del TFRC humano. Rango de AA: 101-150.


Antecedentes

Este gen codifica un receptor de superficie celular necesario para la captación celular de hierro mediante endocitosis mediada por receptor. Este receptor es necesario para la eritropoyesis y el desarrollo neurológico. Se han identificado múltiples variantes con empalme alternativo. [Proporcionado por RefSeq, septiembre de 2015] Función: La captación celular de hierro se produce mediante endocitosis mediada por receptor del receptor de transferrina, ocupado por ligando, hacia endosomas especializados. La acidificación endosómica provoca la liberación de hierro. El complejo apotransferrina-receptor se recicla posteriormente a la superficie celular, con el retorno a un pH neutro y la consiguiente pérdida de afinidad de la apotransferrina por su receptor. El receptor de transferrina es necesario para el desarrollo de los eritrocitos y el sistema nervioso (por similitud). Un segundo ligando, la proteína de hemocromatosis hereditaria HFE, compite por la unión con la transferrina en un sitio de unión C-terminal superpuesto. Inducción: Regulada por los niveles celulares de hierro mediante la unión de las proteínas reguladoras de hierro, IRP1 e IRP2, a elementos sensibles al hierro en el 3'-UTR. Regulada positivamente por estimulación mitogénica. Varios: Los parvovirus canino y felino se unen a los receptores de transferrina humanos y felinos y los utilizan para ingresar e infectar las células. Varios: El receptor de transferrina sérica (sTfR) se utiliza para detectar el abuso de eritropoyetina (EPO) en atletas y como prueba diagnóstica para la anemia resultante de diversas afecciones, como la artritis reumatoide, el embarazo, el síndrome del intestino irritable y en pacientes con VIH. PTM: N- y O-glicosilado, fosforilado y palmitoilado. La forma sérica solo está glicosilada. PTM: Palmitoilada en Cys-62 y Cys-67. Cys-62 parece ser el principal sitio de palmitoilación. PTM: Escindida proteolíticamente en Arg-100 para producir la forma sérica soluble (sTfR). Similitud: Pertenece a la familia de las peptidasas M28, subfamilia M28B. Similitud: Contiene un dominio PA (asociado a proteasa). Ubicación subcelular: Identificada por espectrometría de masas en fracciones de melanosomas del estadio I al IV. Subunidad: Homodímero; unido por enlaces disulfuro. Se une a una molécula de transferrina o HFE por subunidad. Se une al antígeno de histocompatibilidad HLA de clase II, DR1. Interactúa con SH3BP3. Interactúa con la GPC del arnavirus Machupo.


Área de Investigación

Endocitosis; linaje de células hematopoyéticas;


Datos de Imagen




Análisis de transferencia Western del lisado de células HUVEC, utilizando el anticuerpo TFRC.



Análisis Western Blot de células HuvEc usando anticuerpo policlonal CD71. El anticuerpo secundario se diluyó a 1:20000.



Análisis inmunohistoquímico de pulmón humano incluido en parafina, el anticuerpo se diluyó a 1:100



Análisis inmunohistoquímico de pulmón humano incluido en parafina, el anticuerpo se diluyó a 1:100