

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo contra ciclina C**Nº de Catálogo: APRab09588**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,ELISA
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000
Peso Molecular	33-37kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	CCNC
Nombres Alternativos	Cyclin-C (SRB11 homolog) (hSRB11)
ID del Gen	892.0
ID SwissProt	P24863
Inmunógeno	Péptido sintetizado derivado de la ciclina C policlonal humana

Antecedentes


La proteína codificada por este gen pertenece a la familia de las ciclinas. Interactúa con la quinasa 8 dependiente de ciclina e

induce la fosforilación del dominio carboxiterminal de la subunidad grande de la ARN polimerasa II. El nivel de ARNm de este gen alcanza su máximo en la fase G1 del ciclo celular. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen. [Proporcionado por RefSeq, jul. de 2008], función: Componente del complejo Mediator, un coactivador que participa en la transcripción génica regulada de casi todos los genes dependientes de la ARN polimerasa II. Mediator funciona como un puente para transmitir información desde las proteínas reguladoras específicas del gen hasta la maquinaria de transcripción basal de la ARN polimerasa II. Mediator se recluta a los promotores mediante interacciones directas con las proteínas reguladoras y sirve como andamio para el ensamblaje de un complejo de preiniciación funcional con la ARN polimerasa II y los factores de transcripción generales. Se une a la quinasa dependiente de ciclina cdk8 y la activa, que fosforila el CTD (dominio C-terminal) de la subunidad grande de la ARN polimerasa II (ARNp II), lo que puede inhibir la formación de un complejo de iniciación de la transcripción.,PTM:Fosforilado tras daño del ADN, probablemente por ATM o ATR.,similitud:Pertenece a la familia de las ciclinas.,similitud:Pertenece a la familia de las ciclinas. Subfamilia de ciclinas C. Similitud: Contiene un dominio N-terminal de ciclina. Subunidad: Componente del complejo Mediator, compuesto por MED1, MED4, MED6, MED7, MED8, MED9, MED10, MED11, MED12, MED13, MED13L, MED14, MED15, MED16, MED17, MED18, MED19, MED20, MED21, MED22, MED23, MED24, MED25, MED26, MED27, MED29, MED30, MED31, CCNC, CDK8 y CDC2L6/CDK11. Las subunidades MED12, MED13, CCNC y CDK8 forman un módulo distinto denominado módulo CDK8. El mediador que contiene el módulo CDK8 es menos activo que el mediador que carece de este módulo para favorecer la activación transcripcional. Las preparaciones individuales del complejo mediador que carecen de una o más subunidades distintas se han denominado ARC, CRSP, DRIP, PC2, SMCC y TRAP. El par cilina/CDK formado por CCNC/CDK8 también se asocia con la subunidad grande de la ARN polimerasa II. Especificidad tisular: Mayores niveles en el páncreas. Altos niveles en corazón, hígado, músculo esquelético y riñón. Bajos niveles en el cerebro.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de varios lisados, el anticuerpo se diluyó a 1000. El anticuerpo secundario se diluyó a 1:20000.