

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor olfativo 8B2/3
Nº de Catálogo: APRab15322

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,ICC/IF,ELISA
Reactividad	Humano, Rata, Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000
Peso Molecular	35kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	OR8B2/OR8B3
Nombres Alternativos	OR8B2; Olfactory receptor 8B2; Olfactory receptor OR11-309; OR8B3; Olfactory receptor 8B3; Olfactory receptor OR11-311
ID del Gen	26595.0
ID SwissProt	Q96RD0/Q8NNG8
Inmunógeno	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado del OR8B2/8B3 humano. Rango de AA: 199-248.


Antecedentes

Familia de receptores olfativos 8, subfamilia B, miembro 2 (OR8B2). Homo sapiens. Los receptores olfativos interactúan con las moléculas odoríferas en la nariz para iniciar una respuesta neuronal que desencadena la percepción de un olor. Las proteínas receptoras olfativas pertenecen a una gran familia de receptores acoplados a proteína G (GPCR) que surgen de genes con un solo exón codificante. Los receptores olfativos comparten una estructura de siete dominios transmembrana con muchos receptores de neurotransmisores y hormonas, y son responsables del reconocimiento y la transducción de señales odoríferas mediada por proteína G. La familia de genes de receptores olfativos es la más extensa del genoma. La nomenclatura asignada a los genes y proteínas de receptores olfativos de este organismo es independiente de la de otros organismos. [Proporcionado por RefSeq, julio de 2008], función: Receptor de odorantes., similitud: Pertenece a la familia de receptores acoplados a proteína G 1.


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de inmunotransferencia de lisados de células Jurkat y HT-29, utilizando el anticuerpo OR8B2/8B3. El carril derecho está bloqueado con el péptido sintetizado.



Análisis de transferencia Western de los lisados de células K562 utilizando el anticuerpo OR8B2/B3.