

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo factor D****Nº de Catálogo: AMRe01968**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 27 kDa; Observed MW: 27 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	CFD
<b>Nombres Alternativos</b>	DF; ADN; PFD; ADIPSIN
<b>ID del Gen</b>	1675
<b>ID SwissProt</b>	P00746
<b>Inmunógeno</b>	Proteína recombinante del factor D humano

**Antecedentes**


El factor D escinde el factor B cuando este forma complejo con el factor C3b, activando el complejo C3bbb, que se convierte en

la C3 convertasa de la vía alternativa. Su función es homóloga a la de los C1s en la vía clásica.

## Área de Investigación

Inmunología

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western del factor D en lisados de HeLa utilizando el anticuerpo del factor D.