

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo TCEA1**Nº de Catálogo: AMRe02672**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Humano, Ratón, Rata, Mono
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,68 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	Calculated MW: 34 kDa; Observed MW: 34 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	TCEA1
Nombres Alternativos	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIS
ID del Gen	6917
ID SwissProt	P23193
Inmunógeno	Un péptido sintético de TCEA1 humano

Antecedentes


Necesario para la elongación eficiente de la transcripción por la ARN polimerasa II más allá de los sitios de detención

codificados por la plantilla. Los sitios de detención en el ADN tienen la propiedad de atrapar una cierta fracción de las ARN polimerasas en elongación que pasan a través de ellos, lo que resulta en complejos ternarios bloqueados. La escisión del transcrito naciente por S-II permite la reanudación de la elongación desde el nuevo extremo 3'. Varios: S-II se une a la ARN polimerasa II en ausencia de transcripción.


Área de Investigación

Epigenética y señalización nuclear

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de TCEA1 en lisados PC-12 usando el anticuerpo TCEA1.



Análisis de transferencia Western de TCEA1 en lisados K562, C6, 3T3 usando el anticuerpo TCEA1.