

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo CXCL5****Nº de Catálogo: AMRe84591**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,ICC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000,ICC 1:50-1:200,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 12 kDa ; Observed MW: 10 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	CXCL5
<b>Nombres Alternativos</b>	AMCFII; Cxcl5; ENA78; SCYB5;;CXCL5
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	P42830
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado del CXCL5 humano

**Antecedentes**


Participa en la activación de los neutrófilos. In vitro, ENA-78(8-78) y ENA-78(9-78) muestran una actividad quimiotáctica tres

veces mayor para los granulocitos neutrófilos.

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de CXCL5 en lisado de células A549 tratado con TNF alfa y TPA.