

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo TPD52****Nº de Catálogo: AMRe87647**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC/IF,FC
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:200-1:500,FC 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW:24 kDa; Observed MW:24 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	TPD52
<b>Nombres Alternativos</b>	D52; N8L; PC-1; PrLZ; hD52
<b>ID del Gen</b>	7163, 21985
<b>ID SwissProt</b>	P55327, Q62393
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de TPD52 humano


**Antecedentes**

Permite la unión de iones de calcio y la homodimerización de proteínas. Participa en la diferenciación de linfocitos B. Se encuentra en el retículo endoplasmático y la región perinuclear del citoplasma. [Proporcionado por Alliance of Genome Resources, abril de 2022]

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de células MCF-7 utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo TPD52 a 1:1000.